BOOMKWEKERIJEN — PEPINIÈRES

Garden Center BVBA P. Coquette SPRL

Zoniënwoudlaan 349-355
1640 ST-GENESIUS-RODE

Tél. 02 358 11 77
Fax 02 358 44 70
AGR. 6783

Av. de la Forêt de Soignes 349-355
1640 RHODE-ST-GENÈSE

Mars 2002 - N° 6

Garden-Memo

En Mars-Avril :

Des plantes vivaces et des rosiers, des arbres et des arbustes ou des conifères, des petits fruits ou des gros si tu préfères, tu planteras.
Tous tes végétaux, tu nourriras et pour ceux que tu as planté ce printemps ou à l'automne dernier, copieusement tu arroseras.
Tes beaux rosiers, tes arbustes et tes fruitiers surveilleras de près et préventivement ou curativement, tu traiteras.
Ton meilleur sécateur, tu sortiras, pour entretenir les rosiers et plantes grimpantes, les arbustes et conifères et puis aussi les fruitiers que dans les règles tu tailleras.
Tes parterres, allées et sentiers, entretiendras et pour plus de facilité, sous les végétaux, tu pailleras.
A ta pelouse aussi, tu songeras. A l'anti-mousse, si nécessaire, tu la traiteras et pour bien faire, tu la fertiliseras.
Si tout ceci suscite des questions, des conseils dans ce journal, tu trouveras et en venant chez nous, bien plus encore tu en auras.

En Mai-Juin :

Voici venu le temps de la décoration florale. Sur 5000 m² de pépinières, des dizaines d'espèces et des centaines de variétés de plantes classiques ou originales, chez nous, tu trouveras.
L'œil et le bon, tu ouvriras. Si, insectes ou maladies attaquent encore tes rosiers, tes arbustes ou tes fruitiers, énergiquement, tu les combattras.
Du boulot, il y en a ! Après la floraison printanière, tes arbustes, tu retailleras; tes parterres, tu soigneras et si nécessaire tout ton jardin tu arroseras.
Pour avoir une belle pelouse, quelques efforts, encore tu consentiras. Semis, tonte, fertilisation, traitement contre les mauvaises herbes et rénovation, tu entreprendras.
Après tout cela, le corps peut-être éreinté mais le cœur joyeux, avec ta famille ou tes amis, de ton jardin, tu profiteras.

En Juillet-Août :

Avant des vacances bien méritées, quelques travaux encore tu effectueras. Plantes grimpantes, rosiers non remontants et haies à feuillage persistant, tu raccourciras. Autres grimpantes et certains fruitiers, tu palisseras.
Une fois encore, tous les végétaux et pelouses, tu fertiliseras et contre insectes et maladies, ta vigilance, tu garderas.
A l'entretien général, quelques heures encore, tu consacreras et si le mercure grimpe dans les thermomètres, tes végétaux, tu bassineras et ta pelouse, désaltéreras.
Et maintenant, ici ou ailleurs, de Bonnes Vacances, tu passeras. Et puis comme disait Edmond Rostand :
«Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles»
Et n'oublie pas, qu'en bichonnant ton petit coin à toi, c'est la Terre que tu protégeras.
Ce n'est pas important, ça?

I see trees of green
Red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to my self
What a wonderful world.

Louis Armstrong

Les produits C. Bacil avec Micro-organismes

Pour commencer ce journal riche en conseils et renseignements utiles, nous vous présentons notre gamme complète de starters **C. Bacil,** qui sont particulièrement bien étudiés, pour que vos cultures et plantations aient les meilleures chances de réussite.
Cinq produits, enrichis en micro-organismes, qui deviendront rapidement indispensables à tous ceux qui veulent jardiner en harmonie avec la Nature. Ces starters ont été mis au point en collaboration avec la Faculté Agronomique de Gembloux et le Centre Wallon de Biologie Industrielle de l'Université de Liège. ***Ils sont garantis sans aucun danger, tant pour l'homme que pour les animaux.***
L'introduction de micro-organismes sélectionnés dans ces produits a pour effet l'assainissement des différents substrats de culture et du sol. Cela contribue donc à augmenter la résistance aux maladies et à améliorer la qualité de vos végétaux.

1. Engrais C. Bacilgazon

C'est un engrais organique enrichi en micro-organismes. Par leur action, ils améliorent la teneur en humus, assurent une fertilisation de longue durée et favorisent la vie microbienne dans le sol, d'où meilleure aération et meilleure pénétration de l'eau. Ils provoquent aussi une action indirecte contre la mousse, car ils rétablissent le cycle biologique correct dans votre sol.

Formulation : N.P.K. 5+5+20 et 25% de matières organiques
Avec BACTERIES (Bacillus sporulés) : 5 10^6 germes/gr.

A la fin de l'hiver, votre pelouse a perdu de son éclat, mais elle peut retrouver sa belle couleur verte en quelques semaines, grâce à l'utilisation de notre **C. Bacilgazon .**

Les engrais gazon avec micro-organismes garantissent un écosystème équilibré dans votre pelouse, ce qui permet une diminution importante de la présence de mousse. Grâce aux micro-organismes, les résidus végétaux sont transformés en éléments nutritifs et en humus**.**

Mode d'emploi : *Après élimination des mousses (nous consulter), répandre l'engrais C. Bacilgazon, de façon uniforme au début du printemps à raison de 10 kg par 100 m². Répéter le traitement en été et au début de l'automne en fonction des besoins de votre pelouse, à raison de 5 kg par 100 m².*
Si la fumure se fait pendant une période de sécheresse, bien arroser la pelouse pour un effet optimum.

2. ENGRAIS C. Baciljardin

Cet engrais, de par sa concentration, son équilibre N-P-K et la présence de magnésie s'utilise partout au jardin, en association avec les terreaux de fumier (4 fumiers+algues Delbard, Or Brun, Secret Vert) ou le fumier déshydraté ASEF, tant en fumure de fond qu'en fumure d'entretien.

Formulation : N.P.K. 7+6+9 et 25% de matières organiques.
Avec BACTERIES (Bacillus sporulés) : 5 10^6 germes /gr

Mode d'emploi : *Lors de la préparation du sol, en pleine terre, épandre et enfouir superficiellement 25 à 30 kg par 100 m².*
Pour les rosiers, arbustes, plantes vivaces et arbres fruitiers, l'épandage se fera au printemps et/ou à l'automne à raison de 15 à 20 kg par 100 m², et arroser copieusement.

3. C. Bacilrevitalisant

Ce starter va vous permettre d'assainir vos sols (ou tout autre substrat de culture) de façon écologique. Il contient en quantité importante des micro-organismes (Bacillus subtilus) qui vont coloniser la couche arable ou le substrat de culture. Tout en favorisant la transformation des matières organiques, ils vont également empêcher certaines moisissures du sol de s'établir, car ils sont antagonistes de nombreux pathogènes du sol.
Avec BACTERIES (Bacillus sporulés) : 10^7 germes/gr

Mode d'emploi : *Incorporer au sol avant semis ou plantation : 3 kg à l'are. Mélanger à votre terreau de plantation : 1 à 2 kg par m³ (100 gr par sac de 50 L)*
En serre : au printemps et à l'automne, incorporer au sol 500 gr par 10 m².

4. C. Bacilcompost

C'est un produit naturel composé d'enzymes et de micro-organismes qui permettent de dégrader rapidement les matières organiques utilisées pour la fabrication du compost : herbes tondues, broussailles, feuilles mortes, déchets ménagers…
Ce starter permet d'accélérer naturellement le processus de compostage et de réduire le temps nécessaire avant de pouvoir épandre le compost sur le jardin, ou de l'incorporer au sol, lors de la plantation.

Mode d'emploi : *Placer les déchets directement sur le sol en tas d'environ 1,20 m ou dans un récipient sans fond en couches de 20 cm. Alterner les déchets compacts (tonte et feuilles) avec les végétaux ligneux bien broyés ou déchiquetés. Chaque couche sera arrosée et saupoudrée avec* ***C.Bacilcompost****. Quand le tas sera terminé, le recouvrir pour le protéger de la pluie. Un apport de Roche Calcique ou de Cyanagreen, bien réparti, peut s'avérer utile pour rééquilibrer le pH du compost. Un mois plus tard, il faut le brasser pour l'aérer. Le reconstituer et l'arroser si nécessaire. Après 3 mois en été, 6 mois en hiver, le compost peut être utilisé.*

5. C. Bacilbassin

C'est un produit de traitement biologique, qui assure une eau inodore et d'une parfaite limpidité en agglutinant et en précipitant les matières organiques. La présence de bactéries provoque leur décomposition.

Mode d'emploi : C. Bacilbassin *sera utilisé à raison de 1 kg pour 3 à 5 m³ d'eau à traiter, et cela 2 à 3 fois par an.*

CYANAGREEN l'engrais qui déconcerte la mousse.
Solution économique - ne tache pas - bon rapport qualité/prix.

Comment intéresser l'enfant au jardinage ?

C'est dès l'âge de 5 ans que l'on peut initier un enfant au jardinage. A ce moment, il apprend et enregistre facilement bien des notions. Celles-ci l'amèneront tout naturellement à s'intéresser plus tard à un passe-temps qui lui apportera paix et sérénité.

Au début, il voudra copier ses parents ou grands-parents aux doigts verts. C'est à ce moment qu'il faut lui confier un petit coin de terre bien à lui.

Il ne faut pas lui faire exécuter des tâches fastidieuses, seulement des travaux nobles comme les semis de potagères et de fleurs ou la récolte des fleurs, des fruits et légumes. Quel plaisir se sera pour l'enfant de ramener à la cuisine les magnifiques légumes frais qu'il aura cultivés et d'offrir à sa maman, les fleurs et les fruits de son petit coin de terre.

C'est pour cette raison, qu'il est bon de lui constituer un petit assortiment de graines, de légumes et de fleurs, ainsi qu'une gamme de petit matériel adapté à sa taille et à son âge. Par exemple : petite bêche, arrosoir, brouette, griffe, pelle, râteau, gants… **WHB**

Graines BERTRAND «Royal Fleur» et graines DELBARD

Evitons les carences

Les plantes peuvent souffrir d'affections non parasitaires dites maladies de nutrition. Ces maladies résultent souvent d'une insuffisance alimentaire, due à l'absence dans le sol d'éléments minéraux, indispensables à la bonne santé du végétal.

Les carences les plus fréquentes sont :

1. Les carences en **fer** qui se manifestent par des phénomènes de décoloration appelés chlorose. Elles se rencontrent essentiellement dans les sols calcaires. Les espèces sensibles sont : les fruitiers, la vigne, les rosiers, les fraisiers, les Hydrangea et les végétaux de terre de bruyère.
2. Les carences en **magnésium** provoquent une décoloration puis la chute des feuilles. Les espèces sensibles sont : le pommier, la vigne, les rosiers, les conifères….
3. Les carences en **manganèse** se caractérisent par la formation de feuilles petites et épaisses et l'apparition d'une chlorose diffuse entre les nervures. Elles se rencontrent dans les sols calcaires à pH élevé. Les espèces sensibles sont les arbres fruitiers.
4. Les carences en **zinc** qui provoquent une défoliation importante des rameaux, surtout chez la vigne et les arbres fruitiers.
5. Les carences en **cuivre,** surtout dans les sols acides fatigués. Les espèces sensibles sont les arbres fruitiers et la vigne.
6. Les carences en **bore** qui provoquent un retard au débourrement des boutons floraux et l'avortement des fruits.
   Elles se rencontrent chez les arbres fruitiers.

Une fumure bien équilibrée, une acidité normale du sol et le maintien de l'équilibre biologique par l'apport régulier de micro-organismes, vous éviteront beaucoup d'ennuis culturaux.

Pour éviter ces problèmes, un traitement annuel aux oligo-éléments COMPO Hortrilon serait très judicieux.

75 ans Engrais SAP Meststof

Les géraniums vivaces

Géranium Orion

Le terme Géranium est employé à tort lorsque l'on qualifie du même nom les plantes faisant partie du genre *Pelargonium*. Il s'agit de deux genres bien distincts appartenant toutefois à la même famille, soit celle des Géraniacées. *Les Geranium* sont vivaces et les *Pelargonium* sont annuels….sous notre climat.

Les *Geranium* qui nous intéressent ici sont des plantes vivaces très rustiques et la place que nous leur laissons dans nos jardins ne cesse de grandir et avec raison. Il n'existe pas beaucoup d'autres genres de plantes qui peuvent offrir une telle variété de couleurs, feuillages et tailles.

Leurs fleurs sont simples ou doubles, généralement à 5 pétales, de couleur bleue, blanche, rose ou carmin, parfois veinées. La floraison s'étale en général de mai à juillet, certaines variétés ayant la possibilité de refleurir en fin de saison si l'on les rabat fortement et les refertilise. Les nouveaux hybrides commencent en général plus tard mais se rattrapent sur la durée de floraison. Les fruits ont la particularité de ressembler à un bec de grue (du grec geranos), d'où leur nom en latin.

Il existe des *Geranium* de 10 à 125 cm de hauteur, certains restant compact, d'autres s'étalant en vastes couvre-sols. Ils ont la particularité de ne pas demander de taille, seulement un nettoyage au printemps pour les rajeunir, ni de traitements phytopharmaceutiques, ils n'ont presque pas d'ennemis.

Certaines variétés supportent l'ombre et la sécheresse : *G . cantabriense, G. macrorrhizum, G. phaeum, G. nodosum, G. oxonianum, G. versicolor*…..; d'autres l'ombre et l'humidité : *G. sylvaticum* en var…; d'autres encore les zones ensoleillées *: G. endressii, G. Mavis Simpson, G. magnificum, G. pratense, G. renardii, G. Russel Prichard, G. sanguineum*,…..

Leur association avec les rosiers est de plus en plus appréciée. La diversité des formes, couleurs et moments de floraison des *Geranium* permet de trouver la variété adéquate.

Venez retrouver dès ce printemps plus de 90 variétés de *Geranium* en stock en notre pépinière

Les pivoines : herbacées ou arbustives

C'est une des plus belles plantes vivaces, tellement ses fleurs sont éblouissantes. Elles peuvent être associées à d'autres plantes vivaces (Lupinus, Delphinium…), mais elles donnent toute leur beauté en isolé ou entre des arbustes à floraison printanière (Chaenomeles, Kerria, Kolkwitzia….) et des rosiers.

Il existe deux groupes : les arbustives, qui peuvent dépasser 1.50m et gardent une structure de bois en hiver et les herbacées qui ressortent chaque printemps et atteignent 1.00m.

Les pivoines sont des plantes gourmandes ne tolérant pas d'être déménagées trop souvent. Elles croissent en terrain profond, riche en matière organique et se drainant aisément. Un apport de terreau de fumier et d'engrais organique **C BacilJardin** est souhaitable entre octobre et avril. Elles aiment les endroits ensoleillés ou légèrement ombragés.

Leurs fleurs étant très grosses, elles s'effondrent rapidement sous le poids de la pluie. Pour cette raison, il est judicieux de les soutenir par des supports pour vivaces. Il faut éliminer rapidement les fleurs fanées afin de réduire les risques de **Botrytis**: Pourriture grise, (maladie cryptogamique) apparaissant lors d'un excès d'humidité. Il se forme sur les feuilles, les tiges et les boutons floraux qui deviennent bruns et se dessèchent. Pour lutter contre la maladie : couper et brûler les parties atteintes et traiter avec du thirame (Foram) ou de l'iprodione (KB Rovral) , dès l'apparition des symptômes. Répéter le traitement 10 jours + tard.

Conseil : Apporter chaque printemps un engrais riche en Potasse et en Phosphore (**C. P.K.**), ce qui augmente la résistance et la floraison

A découvrir : les superbes collections de Madame M. Wabbes (Informations dans Jardins Ouverts) et du Cte et Ctesse Augustin d'Ursel (sur rendez-vous : tél. : 09/362.98.25 ou fax : 09/362.82.59)

Nous vous proposons en pépinière une large gamme de variétés en plantes prêtes à fleurir.

Quelques trucs pour bien arroser

L'eau, source de vie, est aussi indispensable à l'homme qu'aux plantes. Elle représente l'élément principal des constituants de la matière vivante. Comment faire pour l'utiliser de manière rationnelle ?

Pour arroser judicieusement, il faut tenir compte des points suivants :

1. ***La structure du sol.*** En sol sablonneux, qui absorbe l'eau très vite, il faut arroser souvent et peu à la fois (2 à 3 fois par semaine). En sol argileux ou humifère, qui retient l'eau plus longtemps, il faut arroser moins souvent mais de façon plus abondante (1 à 2 fois par semaine), après décroutage du sol.
2. ***L'importance du système radiculaire.*** Il faut que l'eau atteigne l'ensemble du chevelu racinaire, sinon elle est perdue. La quantité d'eau nécessaire variera en fonction du développement des végétaux.
3. ***La période de l'année.*** Au printemps et à l'automne, l'arrosage se fera le matin, et en été, à la fin de la journée pour que les plantes en profitent bien pendant la nuit.
4. ***Les conditions climatiques.*** Ne jamais arroser en plein soleil, car il y a risque de brûlures des feuilles et, par conséquent, de maladies.
5. ***La qualité de l'eau.*** Si l'eau est riche en calcaire, en chlore ou en sels, il est conseillé de ne pas arroser sur les feuilles mais bien au pied des végétaux. Si possible, utiliser de l'eau de pluie pour les plantes les plus fragiles.
   Astuce : un bon paillage réduira vos arrosages.

Petit dicton : 1 binage = 2 arrosages.



A enrouleur automatique

Il est important d'économiser l'eau, c'est pourquoi les systèmes d'arrosage programmables de GARDENA sont intéressants, car ils permettent de distribuer l'eau au moment opportun, tout en réduisant de façon significative la consommation, et ce même pendant vos absences. Nous consulter.

GARDENA Spinkler System

Vos rosiers : leur première année au jardin

Au printemps.
- tailler sur 3 ou 4 yeux, enlever le bois mort et brûler les déchets de taille;
- débutter sans mettre à jour le point de greffe;
- épandre un engrais rosiers et l'incorporer au sol par un coup de griffe;
- pailler (mulching ou cosses de cacao) pour maintenir la fraîcheur du sol et éviter au maximum les mauvaises herbes;
- arroser si nécessaire;
- traiter en préventif contre les maladies (Bouillie Bordelaise) et les pucerons.

En été.
- après floraison, tailler les variétés remontantes;
- éliminer les fleurs fanées (couper au-dessus du 3e bouquet de feuilles) et les gourmands;
- début juillet, apporter un engrais spécifique à action rapide, pour favoriser la 2e floraison;
- arroser copieusement par temps sec;
- palisser les rosiers grimpants;
- poursuivre les traitements contre les maladies et les pucerons.

A l'automne.
- faire un apport de terreau de fumier et d'engrais organique (C. Baciljardin) à enfouir à la fourche-bèche;
- butter le pied des rosiers;
- rabattre les rosiers buissons à 40 cm et réduire d'un tiers les arbustifs;
- ne pas tailler les grimpants, mais les palisser.

Actuellement la plantation des rosiers peut se faire toute l'année grâce à la culture en conteneur. Dans celui-ci, le rosier a développé un chevelu racinaire suffisant pour permettre la plantation en toute saison.

Jany France
Très grand choix d'arches

Choyons nos " Camellia "

Pour rappel le caméllia se plante au nord-ouest en terre dite «de bruyère», car il ne supporte pas le calcaire.

Pour bien les réussir, il faut :
- arroser fréquemment car la terre de bruyère se dessèche rapidement et pailler le sol;
- ne jamais arroser avec de l'eau riche en calcaire;
- faire un apport de chélate de fer, si les feuilles commencent à jaunir; **COMPO Hortsilon**
- supprimer les fleurs fanées et le bois mort, tailler et rééquilibrer après floraison ;
- bassiner le feuillage en période de sécheresse;
- faire des apports réguliers d'engrais spécifique (C. Camellia) : à enfouir sur terre humide après floraison et en fin d'été;
- lutter contre les attaques de cochenilles.

Ce dernier point est très important.
Les cochenilles sont des insectes de 1,5 à 3 mm, brunâtres ou jaunâtres. Au stade adulte, elles s'immobilisent, protégées par une carapace cireuse et sucent la sève des plantes sur lesquelles elles se trouvent, ce qui provoque le dépérissement de celles-ci. Elles sécrètent également un miellat dont se nourrissent les fourmis. La plante devient alors poisseuse et se couvre de fumagine.

Moyens de lutte.
1. Traiter les plantes attaquées, avec un insecticide systémique. Bien mouiller tous les rameaux envahis et la face inférieure des feuilles.
2. Pour les plantes en serre, traiter avec un insecticide en aérosol et nettoyer soigneusement les feuilles avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse.

Que faire quand les conifères roussissent?

Chaque année une partie du feuillage interne des conifères meurt et tombe, cela est tout à fait normal et il ne faut pas s'en inquiéter. Ce qui est dangereux, c'est le dessèchement des extrémités des jeunes rameaux.

Nous vous présentons ci-dessous les causes les plus fréquentes de cet ennui et les remèdes à y apporter :
- manque de magnésie provoquant le dépérissement complet. Apporter régulièrement et préventivement un produit riche en magnésie (**COMPO Tonic Conifères**);
- présence d'araignées rouges ou de chenilles mineuses. Traiter toutes les 3 semaines avec un acaricide spécifique ou un insecticide systémique;
- maladie : la rouille. Traiter avec un fongicide;
- plantation dans une terre trop lourde ou humide;
- vent du Nord et sécheresse. Les protéger avec un écran et les arroser toutes les semaines (10 L par arbre);

Il est possible d'éviter ces ennuis majeurs en traitant préventivement les conifères avec un engrais spécifique, un fongicide, un insecticide et un acaricide.

PROTEX

BARENBRUG
Graines pelliculées pour gazon que les oiseaux ne picorent pas.

COMPO Agrosil® LR

Fysisch bodemverbeterend middel
Colloïdaal silicium
28 % kiezelzuur reversibel oplosbaar
13,5 % natriumoxide oplosbaar in water
9,5 % fosforzuuranhydride (P_2O_5) in water en neutraal ammoniumcitraat

- Verbetert arme en steriele gronden
- Bevordert de plantengroei op alle bodems en de regeneratie van de gazons
- Verhoogt de capaciteit van de grond om water en voedingsstoffen vast te houden
- Vermindert de schade aangericht door zware metalen
- Wordt gebruikt bij de inzaai en renovatie van grasvelden en de aanplanting van bodem, struiken en vaste planten

Gebruiksaanwijzing
- *Bodemverbetering bij aanleg of inzaai van grasvelden aan 10 tot 15 kg/are.*
- *Regeneratie van grasvelden (greens, tees, voetbalvelden) : 7 tot 10 kg/are.*
- *Substraatverbetering bij het planten van stads- en laanbomen : 5 tot 7 kg/m² in het opvulsubstraat voor de plantgaten.*

A lire **«Tuyaux de Jardins»**
Vendu au profit de la Fondation Saint Luc



Pots, jarres, vasques...

Asef Terra d'Or

Cacaodoppen
Voor decoratie van borders en tuinpaden. Vermindert de onkruidgroei, werkt bodemverbeterend en is volledig milieuvriendelijk. Dit natuurproduct is ***onvriendelijk*** *voor* ***slakken****.*

Cosses de cacao
Convient parfaitement pour la protection contre le dessèchement du sol et les mauvaises herbes
Il a une action d'amendement et n'acidifie pas le sol. Ce produit naturel est également **répulsif** pour les **limaces**.

Le bois à l'extérieur
woodex

Le réglage manuel final fait de chaque sécateur FELCO le véritable outil professionnel pour la taille exigente.

La lutte biologique... facile et efficace

Horpi Systems
NOUVEAU
Du matériel vivant

Pour avoir de belles palmettes U double

Une palmette U double doit rester constamment symétrique pour que sa végétation soit équilibrée et sa production de fruits régulièrement répartie sur l'ensemble des branches.
Cette symétrie sera maintenue par des tailles régulières et la mise en place de palissages.
La taille de fructification se fait à la fin de l'hiver, lorsque les boutons à fleurs commencent à apparaître. Ceux-ci sont plus gros et plus ronds que les bourgeons à bois qui sont petits et pointus.
La taille des palmettes U double est sévère afin de conserver la forme et le développement prévu. Cependant cette taille est simple, il suffit d'éliminer toute végétation qui se trouve 12 à 15 cm à l'extérieur des tiges de la palmette, tout en conservant un maximum de bourgeons à fleurs.

Il faut également éliminer les gourmands et les rameaux à bois qui apparaîtraient au pied de l'arbre et sur la partie horizontale. Supprimer aussi les pousses malades ou trop faibles.
Les 4 branches verticales de la palmette seront étêtées à la hauteur que vous souhaitez, idéalement 2,50m.
Souvent la production de ces formes est importante. Pour avoir des fruits de calibre normal, il est bon d'en éliminer quelques-uns dans le courant de l'été.
Ces végétaux bien plantés, régulièrement taillés et alimentés en eau et en engrais sont assez robustes pour résister à de nombreux parasites et vivre très longtemps.

D'autres formes palissées telles Verriers, U Simple, Cordons, palmettes obliques se traitent de la même façon.

«Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars.»

Taille et conduite des arbustes à petits fruits

Pour obtenir de bons résultats, il est judicieux de les tailler et de les palisser.

1. Les groseilliers à maquereaux.
Il faut créer un arbuste de 6 à 8 branches avec le centre bien aéré, le tout au-dessus d'un tronc nu de 10 à 15cm.
A l'âge adulte, il faut réduire de moitié la pousse faite par les rameaux principaux l'été précédent. Supprimer les branches malades, faibles ou excédentaires et rabattre les rameaux latéraux qui ont été taillés en été. Eliminer les branches tombantes qui ont tendance à s'enraciner dès qu'elles touchent le sol, ce qui rend la récolte difficile.



2. Les groseilliers à grappes et cassis.
Idem que pour les groseilliers à maquereaux. Par contre la taille d'entretien est différente et elle se limite à éliminer au ras du sol, le bois mort ou abîmé et les vieilles branches moins productives ou excédentaires .Les branches conservées seront raccourcies d 'un tiers sur la pousse de l'année précédente. Ce sont les pousses d'un an qui portent les fruits les plus nombreux. Les pousses jeunes sont plus claires que celles de 3 ans.
3. Les framboisiers.
Chez les non remontants, les tiges portent des fruits la seconde année et meurent ensuite. Rabattre les tiges au niveau du sol, dès la fin de la fructification. Ne conserver que 6 à 10 rejets par mètre linéaire
Chez les remontants, après fructification, éliminer les rameaux de deux ans. A l'automne, après la seconde récolte tailler la partie fructifère du rameau de l'année.
Il est indispensable de palisser les framboisiers.
4. Les mûriers.
A la fin de la récolte, toutes les tiges qui ont fructifié sont coupées à leur point de naissance dans la touffe.
5. Les myrtilliers américains.
A partir de la troisième année, il faut supprimer 2 ou 3 tiges âgées en les rabattant au niveau des jeunes pousses et s'il n'y en a pas, au ras du sol. Supprimer toutes les branches mortes, abîmées et malades.

Pour bien les réussir.
1. Choisir des plants de première qualité.
2. Planter en situation bien ensoleillée et à l'abri du vent. Eviter les sols trop calcaires.
3. Si possible, quelques semaines avant la plantation, désherber l'emplacement prévu et bêcher sur une profondeur de 30 cm. Apporter en même temps du compost de fumier.
4. Au printemps, incorporer **l'engrais C Baciljardin** et couvrir les pieds avec du mulch.
5. Bien surveiller l'apparition de parasites ou de maladies et traiter avec des produits appropriés si nécessaire..

Taillons les glycines

La taille est indispensable pour obtenir une floraison régulière et abondante. Elle s'opère en deux temps :
- en mars, juste avant la floraison lorsque les boutons floraux sont visibles, il faut couper les rameaux de l'année précédente en conservant 2 à 3 boutons à fleurs. Il faut également conserver les brindilles. Former des coursonnes de 15 à 20 cm.
- en juillet-août, on pince les pousses de l'année, à une longueur de 25 à 50 cm. Eviter de couper les rameaux qui servent à établir la charpente; ceux-ci seront taillés aux 2/3 de leur longueur en hiver.

Si votre glycine pousse vigoureusement et ne donne pas de fleurs, c'est normal, car elle ne produit pas d'organes floraux pendant une forte croissance.

Pour éviter ce phénomène, il faut :

- supprimer les engrais azotés et incorporer chaque printemps notre engrais C. P.K. (500 gr à 1 kg selon la force du sujet). Celui-ci sera enfoui au pied de la plante et sur toute la surface occupée par les racines;
- faire souffrir votre glycine en sectionnant certaines racines. Cette opération se fait pendant la période de repos hivernal. Creuser le sol à environ 1m du pied, couper quelques grosses racines au fur et à mesure que vous les rencontrez, reboucher très rapidement afin d'éviter le dessèchement. Cicatriser les grosses plaies.

Secret Vert | **Or brun** | **4 Fumiers Delbard** | **Fumier ASEF**

NEW

www.coquette.be

Surfez... Cliquez... et trouvez :

■ e-news ■ e-ideas ■ e-advices

et bien d'autres choses encore...

See you soon !

Ouvert du mercredi au samedi de
9 à 12h30 et de 14 à 18h
Open van woensdag tot zaterdag van
9 tot 12u30 en van 14 tot 18u.

Ouvert le dimanche de 10 à 13h, de mars
à fin juin et d'octobre à Noël.
Open op zondag van 10 tot 13u. van Maart tot
einde Juni en van Oktober tot Kerstmis

Un terreau spécifique pour la plantation d'arbres, d'arbustes, rosiers et plantes vivaces

Le **Terreau de Plantation La Plaine** est composé de tourbe noire, de tourbe blonde, d'écorces décomposées, de compost, d'engrais et de notre nouveauté, le *DIGESTOR*.

Le *DIGESTOR* est un produit stable et naturel. Il joue le rôle de micro-aérateur et d'activateur biologique en fournissant les oligo-éléments nécessaires au développement des végétaux et des micro-organismes tel **C Bacilrevitalisant** à y incorporer éventuellement.
Son pouvoir d'absorption lui permet d'éviter les pertes d'eau par percolation et évaporation.
De plus, le *DIGESTOR* capte les éléments fertilisants pour les redistribuer ensuite au niveau du système racinaire, ce qui permet donc une diminution des pertes, par percolation, des engrais apportés.
Par ces caractéristiques, le *DIGESTOR* est un véritable tampon pour le substrat et améliore la vie microbienne de ce dernier.

Pour vos loisirs : Jardins Ouverts

Gezellige uitstapje : Open Tuinen

Disponible, dès mars, en nos locaux.

Parking à votre disposition.
Parking tot uw beschikking.

Editeur responsable : Paul Coquette / Conception et réalisation : VJ Concept. Ozo 10 - 6941 Durbuy (086) 40 06 27 © Il est interdit de copier tout ou partie de ce journal sans l'autorisation de l'éditeur.